

PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE MUȘCĂTURĂ DE ȘARPE VENINOS
(VIPERĂ)

Semne și simptome :

După câteva minute, la locul mușcăturii apare o umflătură foarte dureroasă care se extinde rapid; uneori plaga se ulcerează, detașându-se resturi de țesut mortificate.

Concomitent apare greață, vărsături, diaree, slăbiciune, teamă și delir, victima se uită cruciș, respiră cu greutate și neregulat, apar paralizii, convulsii, uneori febră și dacă nu se intervine în 24-48 de ore se poate produce moartea.

Primul ajutor :

Scopul primului ajutor acordat imediat la locul accidentului este de a preveni absorția veninului.

Procedați astfel :

- Așezați victima confortabil și sprijiniți membrul afectat; mișcarea stimulează circulația și răspândește otrava mai repede în corp.

- Calmați victima; frica sau conștientizarea pericolului pot agrava șocul.

- Aplicați un garou deasupra mușcăturii (garoul să nu fie menținut mai mult de o oră și să nu fie legat atât de strâns, încât să dispară pulsul). Din 15 în 15 minute ridicați garoul tot mai sus cu câțiva cm, până aproape de rădăcina membrului.

- Aspirați toxina din plagă prin sugere cu condiția ca cel care dă primul ajutor să nu aibă răni pe buze sau pe mucoasa bucală sau folosiți pentru aceasta o ventuză.

- Anunțați Serviciul medical de întreprindere și ajutați la transportul victimei.-

ȘEF BIROU PM. PM. - P. S. I.,
Ing. LĂUDAT ILIE.

PRIMUL AJUTOR IN CAZ DE INTEPATURI SI MUSCATURI DE
INSECTE.

La majoritatea persoanelor, o mușcătură/ințepătură de insectă provoacă numai o umflătură dureroasă însoțită de înroșirea zonei respective și de senzație de mâncărime.

La unele persoane înțepăturile de albină sau viespe provoacă reacții alergice grave .

Urmăriți dacă apar iritații și umflături în jurul ochilor și gurii, amețeli, vărsături, dificultăți respiratorii.

Dacă observați astfel de semne nu întârziati transportarea victimei la serviciul medical din întreprindere.

Acordați primul ajutor , după cum urmează :

- Aplicați pe rană alcool, o soluție slabă de amoniac sau o pastă de bicarbonat de sodiu și apă.

Evitați folosirea alcoolului și a amoniacului în zona ochilor.

- Dacă acul a rămas înfipt în piele, îndepărtați-l cu atenție împreună cu sacul de venin atașat, pentru a nu se stoarce accidental otrava în rană.

- Dacă acul se găsește în gura victimei, clătiți-i gura cu o soluție de bicarbonat de sodiu (o linguriță la 1 pahar cu apă) sau dați victimei să sugă o bucată de gheață.

- Dacă victima prezintă umflături în cavitatea bucală sau dificultăți de respirație, trebuie urmărită îndeaproape.

Anunțați Serviciul medical de întreprindere.-

ȘEF BIROU P.M.P.M.-P.S.I.,
Ing.

LĂUDAT ILIE.